

16 juillet 1756.

1.

lues deux fois

H

Observations & Reflexions sur divers cas de chirurgie,

Notamment sur différentes hernies & sur quelques

Pierres de La Vessie & de L'urethre.

Par J. J. L. Boir, M^e Docteur en Chirurgie à Dijon, Chirurg. du Grand
hôpital, membre de l'Académie de sc. & b. Lettres de la même ville,
& Associé de l'Académie Royale de Chirurgie.

Un des principaux objets de l'Académie étant de recueillir l'histoire
des différents cas chirurgicaux qui offrent quelque singularité; je crois me
conformer à ses intentions, en lui présentant les récits fidèles de quelques faits
qui m'ont paru pour la plupart assez intéressants, & sur lesquels j'ai fait des
remarques dont je ne reconnoîtrai la solidité que quand elles auront été
approuvées par l'Académie.

Quoique les hernies soient des maladies qu'on rencontre fréquemment
dans la pratique; les causes qui les produisent, le lieu qu'elles occupent, les
accidents qui les accompagnent, présentent tant de variété, que chaque
hernie semble ne conserver que le caractère générique qui la distingue de toutes autres
maladies chirurgicales & demande presque toujours des considérations particulières
sur son Espèce.

Vous devez principalement à M. de Harengiers la fourniture de

(a) mém. sur plusieurs
hernies singulières; dans
les mémoires de l'Acad. R.
de chir. T. I. p. 707 &
suiv. c. 4.

(b) Observ. sur la
Cure des Polypes. p.
154. & suiv.

(c) Tr. des Accouch.
Mém. franç. T. I. p.
157 & suiv.

(d) Observ. sur les
accouch. T. 2. p.
171. & suiv.

l'Entérocele vaginal (a), Espèce de hernie que M. Boir a éclairée d'un nouveau
jour par ses judicieuses réflexions (b), & sur laquelle le D^r Smellie a donné
des préceptes (c) autorisés par des observations intéressantes (d). j'ai eu
occasion depuis peu de rencontrer une maladie de cette Espèce: mais l'endroit
occupé par l'intestin n'étant pas précisément le même que celui qui en
détermine par les observations que j'ai lues, je pense qu'il ne sera pas inutile
de communiquer l'histoire suivante.

Observation I. Sur un Entérocele vaginal, où l'intestin étoit
situé ^{dans l'aggr. près de} l'orifice de la Matrice.

Une Marchande qui étoit trompée sur le terme de sa quatrième grossesse,
qui pendant l'espace de deux mois étoit chaque jour à la veille de couches, dans
ces intervalles de temps elle ressentit très souvent des douleurs dans le voisinage
de la Matrice, qu'elle distingua bien n'être pas de la nature de celles qui précèdent

ARC 16 d. 4 m^o 112



l'enfantement. Quand elle me ^{témoignait} ses inquiétudes à ce sujet, elle m'assura qu'il n'y avait ni fleurs blanches, ni rétention d'urine, ni constipation; mais quoiqu'elle eût accouché plusieurs fois, elle ne voulut point se laisser toucher; c'était cependant le seul moyen que je pus lui proposer en pareille circonstance pour reconnaître la cause de ses douleurs.

Je fus appelé le 20 du mois de janvier dernier (1756) pour la secourir dans le travail d'enfant. Les maux se faisoient d'abord avec un peu trop de lenteur; cependant ils augmentèrent au point que la tête de l'enfant qui se présentait bien ne tarda pas à s'engager. Elle ne fut pas plutôt engagée, qu'une grande douleur naturelle en pareil cas fut, si j'ose le dire, coupée par le milieu, & se partit en deux sans gradation, & fut sur le champ remplacée par une autre douleur très violente qui fit jeter les hauts cris à la malade, & la fit se plaindre d'une colique plus vive qu'elle n'en eût jamais ressentie. Je m'aperçus que la tête de l'enfant qui n'était point enclavée, remontoit pendant cette douleur extraordinaire: ce qui me prouva qu'elle n'était pas de la nature des expulsives, & qu'il falloit lui chercher une autre cause que le travail. Je la trouvai dans le vagin.

Il y avoit à quelques lignes de distance de la partie antérieure de l'orifice de la Matrice du côté droit une tumeur de la grosseur d'une noix, très sensible au toucher, rénitente, & que je reconnus pour une hernie intestinale comprimée par la tête de l'enfant. Le vomissement qui vint alors en un signe trop équivoque pour qu'on le rapporte ici plutôt à la hernie qu'à l'accouchement prochain.

J'eus d'abord intention de repousser la tête de l'enfant & de faire rentrer la tumeur avant que de terminer l'accouchement; mais craignant qu'il ne fût pas possible de la maintenir réduite; & surtout m'apercevant que les douleurs de l'enfantement qui se continuoient toujours à celles de la colique, faisoient avancer le fœtus, quoiqu'elle s'arrêtât subitement & toujours sans gradation peu de temps après avoir commencé; je priai la malade d'employer toute sa force expulsive & de s'étourdir sur la violence des maux qu'elle souffriroit par ces efforts. Elle eut assez de courage pour suivre mon conseil & l'accouchement fut bientôt terminé. Je fis ensuite rentrer aisément l'intestin & la malade ne souffrit plus.

J'étois assuré que la naissance de cette hernie étoit postérieure au précédent accouchement dans lequel j'avois aidé la malade. Je me doutois plus qu'on ne lui attribue à ces intestins les douleurs qui s'étoient fait sentir dans les derniers mois de la grossesse; mais j'ignorois encore d'où la descente de l'intestin avoit pu dépendre.

J'appris alors par mes informations auprès de cette femme & de son mari qu'il y avoit quelques mois qu'elle avoit fait une chute ou plutôt un faux sur ses deux pieds; qu'il étoit survenu le lendemain une perte assez abondante dont la durée n'avoit pas été de plus d'une demi-heure; & que son mari s'étoit aperçu quelquefois depuis cetems-là seulement qu'il y avoit une petite tumeur dans le Vagin de sa femme. Cela me suffit pour être certain que la hernie dépendoit de la secousse que la malade avoit soufferte dans l'instance de sa chute.

Les Douleurs de folique intestinale se réveillèrent environ vingt quatre heures après l'Accouchement: Elles étoient bien distinctes de celles des tranchées utérines qu'elle faisoient aussi sentir: mais la malade ne vomit point. Je trouvais la tumeur beaucoup plus petite qu'elle n'étoit la veille; Elle céda facilement sous mon doigt & la folique cessa quand la hernie fut rentrée. Je distinguai cette fois le bruit d'une égrece de gargouillements qui m'étoit échappé la veille.

Le jour suivant les douleurs revinrent avec une telle violence qu'elles mirent la malade dans un danger d'autant plus pressant que la perte se supprima, qu'une fièvre ardente se mit de la partie & qu'il y eut même beaucoup d'affection hypérique avec le météorisme du bas ventre & une grande sensibilité à l'hypogastre. Je cherchais en vain la tumeur intestinale, il n'y en avoit aucune alors. Les fomentations, les injections & les lavemens émollients aidés par les gileps antispasmodiques rendirent un saignée nécessaire, qui fut encore un peu troublée pendant deux ou trois jours sans que la hernie se fît sentir. La perte des loches se passa très bien & la malade s'en parfaitement rétablie: Cependant sur la fin du mois de May suivant, après quelque fatigue elle reprit des douleurs intestinales légères & de peu de durée, sans que la tumeur vaginale ait reparu.

Il y a de si essentielle différence entre les observations déjà publiées sur l'Entérocele vaginal & celles-ci, que je dois devant exposer celles que j'ai faites, sans prétendre qu'il ne m'en soit échappé aucune.

(a) Mem. del Acad. R. de Chir. T. 1. p. 707.

(b.) Observ. sur les polypes. p. 161.

(c.) Observ. sur les Accouch. T. 2. p. 6.

(d) ibid. p. 176.

La femme du Caucase dont M. de Harcourt a donné l'histoire (a) n'étoit point dans un état de grossesse quand sa hernie parut pour la première fois: il ne m'est point dit que le fœtus de la folle qui offrit aux yeux de M. le Roy & de M. Louis un Entérocele vaginal fut celui d'une fille grosse (b): à juger sur le récit du Dr. Smellie (c), l'observation communiquée par M. Stubbis (d) est la seule des trois qu'il rapporte, sur laquelle on puisse conjecturer que l'Entérocele vaginal se soit formé dans le tems de la grossesse; encore cette



n'en-ait pas énoncé. mais la marchande étoit enclinte quand sa hernie
en survenut; on ne peut dater sa naissance que du sixième mois de sa
grossesse; dans un temps où la matrice avoit déjà un volume considérable
qui paroitroit devoir s'opposer à la formation d'une hernie de cette espèce?
Si celle-ci ne confirmoit pas quelques conjectures les plus vraisemblables, j'en
soudrait très-loin de la vérité.

Il y a lieu de croire que par les efforts que fit la marchande pour se tenir
à l'instans de sa chute sur les deux pieds, les muscles du bas-ventre & le
diaphragme comprimèrent les parties exposées à leur action contractive; & que
cette force communiquée aux laisses des viscères & leur pesanteur à faire glisser
l'intestin le long d'un des côtés de la matrice & à le chasser vers le plancher
du bas-fond du bassin, qu'il a force dans la suite pour se faire jour au côté droit
de l'orifice de ce viscère ^{mais plus} antérieurement que latéralement.

(2) M. des Accouch. T. I. p. 158. Mais l'intestin a-t'il passé entre le Rectum & la Matrice, ou entre celle-ci
& la Vésicule? le D^r Smellie n'admet que la première route (a); & dans ce cas
la hernie doit se trouver plus voisine de l'ischion que du pubis: aussi ces auteurs
recommandent-ils de relever la tête de l'enfant pour réduire son Entérocele lorsqu'il
est comprimé pendant le travail, puisque l'intestin est situé à la partie postérieure
du Vagin. M. le Roy s'exprime avec plus de justesse quand il détermine le siège
des hernies intestinales par le Vagin dans les parties latérales & profondes (b). C'est
dans cette situation que furent trouvés celles de la folle & de la femme du Peanier:
celles que le D^r Smellie même observa étoient situées de côté, ou, ce qui est plus exact,
s'étoient ouvert une route par les parois latérales du Vagin.

(b.) Observ. sur les Polypes. p. 160. Il y a une exacte conformité dans ce point général, entre la hernie de
la Marchande & les autres: cependant toutes les observations publiées par ces
celebres auteurs annoncent que l'intestin se portoit plus vers la partie postérieure
du Vagin que vers l'antérieure, & qu'il se trouvoit pas conséquent toujours
derrière l'orifice de la Matrice. j'en excepte l'observation de M. de Garangeon
qui décrit cette tumeur dans une situation précisément latérale, qu'on ne
peut pas en déduire quel intestin se portoit plutôt à la partie postérieure du
Vagin qu'à l'antérieure. Il n'en étoit pas de même de la hernie de la Marchande
dont la base se faisoit plus sentir vers la partie antérieure de l'orifice interne que
vers la postérieure, quoiqu'elle fût située un peu latéralement; de sorte que
dans le temps de douleurs expulsives la tête de l'enfant comprimoit l'intestin
contre le pubis & non pas contre le sacrum ou l'ischion: ce qui me fait croire
qu'il se soit échappé entre la matrice & la Vésicule.

je me garderais bien d'avancer que pour prendre cette route il ait été obligé de passer par dessous le fond de la matrice & de descendre le long de toute la surface antérieure de cet organe déjà bien dilaté aux environs du fœtus & de la grossesse, mais je presume que l'intestin a passé par devant le ligament large droit, qu'il a foltoyé la partie latérale de la matrice & qu'il en descendu par cette voie le long de son fond jusques dans le Vagin qu'il a forcé dans sa partie supérieure plus antérieurement que latéralement, pour se montrer à très-peu de distance de la partie antérieure de l'orifice utérin.

Deux circonstances me paroissent confirmer mon opinion sur la route que l'intestin avoit tenue. 1°. j'ai appris que les douleurs intestinales ressenties par la malade dans les deux derniers mois de sa grossesse étoient toujours plus vives & plus fréquentes lorsqu'elle étoit debout que quand elle étoit couchée. En effet dans la grossesse la matrice étoit plus penchée en devant qu'en arrière (a), elle de m. lever sur doit pas son poids comprimer davantage l'intestin situé entre elle & l'espée que le mécanisme de différentes grossesses. S'il étoit placé entre elle & le rectum; & la compression doit être moindre lorsque la malade est assise que dans toute autre situation.

2°. j'ai déjà fait remarquer la grande sensibilité de la région hypogastrique le troisième jour des loches, tandis que la folie intestinale étoit dans sa plus grande violence: mais je dois ajouter ici que j'observais distinctement ce jour-là que cette région n'étoit pas également sensible partout; & qu'elle l'étoit beaucoup plus du côté de la hernie que de l'autre: la veille même lorsqu'il n'y avoit que l'entérocele une parure diminuée de volume, il n'y avoit absolument que le côté droit qui étoit occupé où la malade ressentait de la douleur lorsque je touchois la région hypogastrique. Il est évident que cette douleur locale dépendoit de la proximité de l'intestin qui souffroit une compression: Et si elle fut plus étendue dans l'hypogastre le troisième jour des loches que le second; C'est que dans celui-là il se joignit à la douleur intestinale une douleur utérine occasionnée par l'état de phlogose où se trouvoit la matrice dans le commencement d'une fièvre très-vive & d'une suppression des loches, dont l'écoulement n'avoit point été suspendu la veille.

La sensibilité locale dont je viens de parler ne doit-elle pas être regardée comme un signe certain de la situation du boyau entre la matrice & l'espée? Puis-je être permis d'aller plus loin. Si c'en est un; dans le cas extrême d'une hernie de cette espèce que l'on n'auroit pu réduire par le taxis & qui



menacerait la malade d'une mort prochaine, le chirurgien porteroit-il d'une main trop hardie le bistouri sur l'endroit douloureux pour, à l'aide d'une incision, découvrir l'intestin & le retirer d'un lieu où son séjour va être funeste? Cette idée ne peut augmenter les ressources de notre art qu'après avoir été mûrie par la réflexion; la puis-je mettre la soumettre qu'à celle de l'Académie.

Le Volume de la Tumeur constitue la troisième différence qu'on trouve entre cette hernie & celle qu'on a décrite dans les Observations précédentes. Les unes remplissoient jusqu'à tous le Vagin, les autres sortoient par son orifice; il y en a qui faisoient saillie entre le péinée & l'Anus; elles étoient toutes d'une grosseur fort remarquable, & par conséquent furent plus aisément reconnues: la hernie de la Marchande n'excedoit pas le Volume d'une Noix, dans le temps même qu'elle étoit le plus gonflée par l'étranglement que la tête de l'Enfant occasionnoit à l'intestin. C'en sans doute par rapport à la petitesse de la tumeur & à la proximité de l'Accouchement que l'orifice de la matrice n'étoit point dans cette position inclinée que M. Levee observa sur le cadavre de la folle.

Il est vraisemblable que la diminution du Volume de la tumeur lorsqu'elle reparut le lendemain, dépendoit de ce que la matrice en se relevant après le sort de l'Enfant & de l'arrière fais, avoit entraîné avec elle une portion de l'intestin réduit sur le champ, & dont il n'étoit retombé qu'une plus petite partie que la veille.

En admettant cette Espece de rétraction du boyau & en s'arrêtant à quelques autres phénomènes du troisième jour des fouches, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les douleurs intestinales qui se rapportoient toutes au voisinage de la matrice furent si peu violentes, sans qu'il fût possible de distinguer la tumeur, ou plutôt sans qu'il y eût une au même temps qu'elle se présentoit. En effet quoiquela matrice eût déjà diminué de grandeur, elle avoit acquis plus de fermeté, tant par l'affection hysterique à laquelle la malade en étoit sujette, que par la phlogose de ce viscere qui excitoient non seulement la fièvre lente & fort ardente alors, mais encore la suppression des lochies. Il y a plus: l'entre ne se étoit point ouvert depuis le travail & l'excrétion de l'urine étoit aussi suspendue ou au moins ralentie, comme elle a coutume de l'être dans le temps de la fièvre. Ainsi les parties qui occupent le bassin inférieur étoient dans un état de tension après considérable pour ne pas permettre un libre passage à l'intestin; & en l'arrêtant dans sa route elle avoit, après de force pour le comprimer vis à vis le bord supérieur interne de la branche

transversale du pubis, où il souffroit sans doute un pincement dans sa
partie la plus basse. On peut deviner une telle situation du boyau par les
circonstances qui l'ont précédée & par les accidents qui l'accompagnoient;
mais il n'est pas possible qu'un intestin placé de la sorte fasse une faille
sensible au dessous du pubis.

Il y a lieu de croire que l'Entérocele vaginal ne reparoit plus depuis
les fouches de la Marchande, parcequ'une femme n'étant point grosse, ses
Viscères du bas-ventre sont plus à l'aise & sa matrice rétablie dans son état
naturel fait l'office d'une pelotte, d'un support de brayes qui ferme à l'intestin
l'issue que des exercices pénibles ou peut-être une nouvelle grossesse lui rouvrieroient.
Peut-être même la hernie ne reparoitra-t-elle qu'aux environs du sixième mois,
temps auquel elle s'en forme. Ceci me le fait soupçonner, c'est que les Viscères
se trouveront à ce terme dans la même situation à peu près que lors de sa naissance.
Les intestins occupent actuellement un lieu plus bas qu'pendant la grossesse;
et le sac herniaire, s'il s'en est formé un peu avant le terme de
la chute, doit par cette position être aujourd'hui affaissé & plié; mais quand
la dilatation de la matrice au sixième mois aura soulevé un peu le boyau,
le sac herniaire sera développé & rétabli dans un état qui le rendra propre à livrer
à l'intestin un passage qu'il s'en est déjà fait.

L'Épiploon n'accompagne pas le boyau dans cette hernie: En quand elle
fut réduite je remarquai une espèce de flaccidité dans l'endroit du Vagin où elle
s'attendoit avant sa réduction. Je crois que cette flaccidité annonce que le sac
herniaire, s'il y en a toujours un dans le sortir de descender, a été réduit avec
l'intestin, surtout au bas que la paroi du Vagin n'offre pas une certaine
épaisseur au touché: Car, quand bien même on ne sentiroit plus de tumeur
à l'endroit affecté; si après la réduction de la hernie Entéro-vaginale, dans un
bas où la femme ne seroit ni grosse ni en couche, l'endroit enfoncé n'est
la concavité naturelle étoit douloureux & tendu; si en même temps les accidents
qui accompagnent l'étranglement subsistoient; il y auroit lieu de croire que
l'intestin est encore étranglé par le sac herniaire qui auroit contracté de
adhérence avec lui, ou avec le vagin, si l'on y distinguoit une plus
grande épaisseur dans sa paroi affectée que dans les autres, principalement
dans le bas d'une ancienne hernie.

Il n'y a pas longtemps que la Chirurgie compte le péritoine parmi
les parties qui s'étranglent quelquefois l'intestin. Il n'en a dû être sur cette



matière sur un mémoire où l'on trouve plusieurs observations importantes. Cette cause d'étranglement a été déjà annoncée par M. Le Dran & par M. de Lafaye: mais c'est une cause de maladie récemment connue & qui à cet égard exige plus qu'aucune autre ~~d'être~~ d'être examinée en toute son étendue par les chirurgiens; non seulement afin qu'ils la confirment par leur observations les découvertes des sçavans qui l'ont publiée les premiers, mais encore afin qu'ils reconnoissent toutes les faces sous lesquelles cette cause de maladie peut se présenter.

1^{re} Observation suivante montre l'étranglement formé par le sac herniaire dans sa plus grande simplicité: je n'en ai vu aucune qui le décrive dans ce degré que je regarde comme le premier de l'extremum. C'est quelquefois celui où l'on s'arrête le moins, parce qu'il n'est rien d'étonnant, rien de merveilleux; mais il est cependant nécessaire de le connaître, si l'on veut avoir des notions bien exactes d'une maladie & de toutes ses espèces.

Observation II. Sur un Entérocele, où le sac herniaire seul étranglait l'intestin loin de l'anneau & du côté du scrotum.

Claude Voiture, natif de Bourlens, diocèse de Langres, âgé de 28 ans, Compagnon Drapier chez Nicolas Mafour, rue St. Nicolas à Dijon, fut transporté au grand hôpital de cette ville le 8 du mois de janvier 1753. je le visitai même fois & j'eus trouvé à l'aîne droite une hernie de la grosseur d'un œuf de fauce, mais plus longue & qui descendoit jusqu'à la moitié du scrotum. La tumeur étoit renitente, il n'y avoit aucun changement de couleur à la peau; le ventre étoit peu gonflé, quoiqu'une colique violente accompagnée d'une grande fièvre tourmentât le malade.

Il me dit qu'il avoit cette hernie depuis environ vingt ans; qu'il n'avoit point porté de bandage; qu'elle ne rentroit jamais; qu'il en souffroit pour la quatrième fois depuis ce tems; que différents remèdes qu'on avoit employés avoient fait les douleurs les trois autres fois, sans qu'on eût fait rentrer l'intestin; que la tumeur diminuoit seulement lorsqu'il ne souffroit plus; & qu'elle ne l'incommodoit pas ordinairement. Le malade ajouta que le 6. du mois la colique s'étoit fait sentir vivement à midi; qu'il s'étoit bouché à faire appliquer sur la tumeur de l'huile d'amandes douces; qu'il avoit rompu plusieurs fois la nuit suivante; qu'il avoit passé le 7. avec les mêmes accidens; & que le 8. il avoit rendu par le vomissement

des matières très fécales.

Je le fis saigner le soir même du 8; on appliqua des cataplasmes molles sur la tumeur; on le saigna de nouveau dans la nuit: la folique ne diminua point & le malade vomit encore des matières fécales. Je le revis le 9 à cinq heures du matin; je trouvais la fièvre beaucoup moindre que la veille, mais les autres accidents n'avoient pas diminué. Je tentai de faire rentrer la hernie. Elle parut céder un peu du côté de l'anneau, ce qui me donna l'espérance d'obtenir bientôt une réduction suffisante; bien persuadé que la hernie n'étoit jamais rentrée depuis vingt ans, & y aianseu plusieurs foliques, l'intestin avoit contracté des adhérences qui empêcheroient qu'on ne le replaçât tout entier dans la capacité du bas-ventre. Cependant quoique le remplacement fut très incomplet, je ne fus pas être obligé d'avoir fait le champ recourir à l'opération; d'autant mieux que le malade étoit un peu moins tourmenté que le jour précédent. Je fis répéter les saignées qui avec les laxemens, les cataplasmes & la situation convenable procurèrent au malade un jour moins orageux; mais la nuit tous se réveillèrent pour le faire souffrir.

Le 10. je n'apperçus aucun changement à l'état dans lequel le malade s'étoit trouvé pendant la journée du 9. Néanmoins sur le rapport qu'on me fit de ce qu'il étoit passé la nuit, je priai M. Maret mon collègue à l'hôpital, de venir examiner mon malade. Nous nous bornâmes à le saigner encore & à continuer les autres remèdes que j'avois déjà mis en usage. Du 10. au 15. il eut une constante alternative d'accidens violens pendant la nuit & d'une espèce de calme pendant la journée. Je ne comptai plus alors pouvoir guérir le malade sans opération: il étoit considérablement affaibli par les douleurs de folique & la fatigue du vomissement; son pouls commençoit à baisser & son ventre étoit fort tendu. Dans la dernière tentative que j'avois faite pour replacer l'intestin, je m'étois toujours apperçu qu'il cédoit comme à la première du côté de l'anneau; mais que la tumeur revenoit à sa grosseur accoutumée & peu de temps après que j'avois cessé de la toucher. M. i Maret approuva l'opération que je proposai; je la fis sur le champ en sa présence.

Lorsque j'eus ouvert le sac herniaire dans sa partie supérieure je glissai mon doigt sur l'intestin, & le dirigeant du côté de l'anneau je ne



Sentis aucune résistance, aucun étranglement; j'en touchai le bord avec après de facilité: j'introduisis une sonde, elle passa ~~facilement~~ dans le bas ventre & y glissa aisément dans l'anneau. Je loulis retirer avec précaution l'intestin de son sac à moitié ouvert dans l'opération de le faire rentrer avec facilité; mais il n'enforçait point & j'eus qu'il falloit ouvrir entièrement le sac. En introduisant pour cet effet une sonde cannelée que je voulois faire passer sur l'intestin jusqu'au bas du sac, je m'aperçus qu'à quelques lignes de mon incision elle n'entroit qu'avec grande difficulté; j'en prolongeant d'un pouce cette première incision, je sentis avec le bistouri une résistance dans un point que je n'avois pas trouvé dans le reste du trajet de l'ouverture faite au sac. Je connus alors que j'avois rencontré & levé l'obstacle à la réduction: En effet j'aperçus, je sentis à la face interne de ce sac un rebord épais d'environ une ligne, & je vis sur l'intestin dans la foulure étoit un peu brune, une demi-ligne fœculaire absolument noire qui dépendoit de la compression faite par le rebord de cette partie de sac qui faisoit l'étranglement. Alors je retirai facilement la portion du scrotum que je n'avois pas ouverte plus de deux pouces d'intestin & j'eus les papes sous l'anneau.

Ces intestins n'avoient contracté aucune adhérence, quoiqu'il eussent resté vingt ans hors du ventre & qu'il eussent été étranglés quatre fois: mais il y en avoit de très fortes entre le sac herniaire & les légumens dans sa partie inférieure; j'emportai du sac tout ce qui m'en fut possible d'enlever & j'eus pour le malade à l'ordinaire. D'abord après l'opération les accidens cessèrent; le ventre fut libre de ce jour même. Pendant tout le traitement le malade s'emporta à souhait & sa plaie a été bientôt cicatrisée. Depuis la guérison j'ai examiné plusieurs fois cet homme. La hernie n'a plus reparu; aucune espèce de folie ne s'en fait ressentir; une bonne cicatrice empêche sans doute son intestin de repousser la route du scrotum. Il m'a souvent promis de porter un bandage que je lui ai conseillé par précaution, mais je ne crois pas qu'il aie encore tenu sa parole.

Je ne donne pas cette observation comme le premier exemple d'un

étranglement occasionné par le seul sac herniaire rétréci dans un seul

(2) Observation de chirurgie. obs. point. Des faits à peu près semblables ont été observés par M. le Dran (2), 57. & 58. C. 2.

- (2) Opérations de Dionis avec des Notes. Edit. de 1740. p. 524.
- (b) Traité de hernies. 1749. T. 2. p. 51. 80.
- (c) ibid. p. 558 56.
- (d) ibid. p. 6.
- (e) ibid. p. 19.
- M. de la faye, M. Arnaud (b) & M. Vacher (c); mais ce M. de la faye vu que le rétrécissement étoit presque toujours à l'entrée du sac, on ne l'a trouvé que dans le ventre après la réduction du sac avec l'intestin. j'appercus au contraire dans la hernie de Voiturez l'étranglement au milieu du sac, au dessous de l'anneau & presque à l'entrée du scrotum: dans un point bien éloigné de l'anneau & presque à l'entrée du scrotum: ce qui rendit l'opération pour cette hernie une des plus faciles que l'on puisse rencontrer dans sa pratique. Il en est de même que M. Arnaud fait voir dans sa 1^{re} observation (d) un étranglement à un travers de doigt au dessous de l'anneau compliqué avec un autre à l'entrée du sac; & sa 2^e observation nous apprend que M. Pineau trouva dans la hernie d'une femme de Melun une bride également située qui fut prise pour ce Chirurgien pour l'anneau même (e). Cependant l'étranglement formé par le péritoine dans la hernie de Voiturez étoit beaucoup plus bas que celui qui fut appercu dans celle de la femme de Melun, presque je trouvais le rétrécissement à près de deux pouces de distance de l'anneau du côté du

Scrotum.

L'aurois été impossible de réduire l'intestin avec le sac, comme j'en eussis eu de l'intérieur fêter l'anneau avec quelque fois: les fortes adhérences du sac de la hernie de Voiturez avec les tégumens formoient à cette réduction un obstacle insurmontable; Aussi cette hernie n'étoit-elle jamais rentrée dans l'espace de vingt ans quoiqu'elle eût plusieurs fois diminué de volume après la cessation des accidents occasionnés par les étranglements de l'intestin antérieurs à celui qui me força d'opérer. Mais il est essentiel de remarquer que les plus fortes adhérences du sac n'étoient qu'au dessous du rétrécissement qui comprimoit l'intestin: ce qui me fait croire que ce rétrécissement avoit été formé par la compression du rebord de l'anneau, tandis que l'intestin n'étoit pas encore parvenu jusqu'au scrotum & dans un temps où il avoit été étranglé; qu'ensuite la hernie s'étoit allongée peu à peu par la chute d'une plus grande portion d'intestin; & que le rétrécissement du sac s'étoit éloigné de l'anneau à proportion que l'intestin étoit descendu dans le scrotum: je n'en vois aucune autre cause qui ait pu donner lieu à la formation de ce rétrécissement; & il en est d'autant moins vraisemblable qu'il ait pu se former au point de l'anneau que j'en ai trouvé, que Voiturez n'avoit jamais porté de bandage qui dans le cas d'une mauvaise situation

13.
soudains déplacements de la pelote auroient pu comprimer le sac à l'endroit
où il étoit retenu dans le temps de l'opération.

Cette situation de l'étranglement & du sac de l'anneau ne pourroit elle pas
être reconnue avant l'opération? Quand ~~j'ai~~ j'étois tenté de réduire la hernie
de Voitures, j'étois qu'elle feroit un peu du côté de l'anneau, qu'il venoit
une portion de l'intestin qui sortoit peu de temps après que j'en touchois plus
la tumeur. Cette circonstance qui me fit différer l'opération ^{pas} l'opération ~~par~~ l'opération
qu'elle me donnoit de pouvoir réduire l'intestin dans la suite, ne deviendroit
elle pas un signe qui prouveroit au contraire l'impossibilité de la réduction
complète par le Taxis, & qui détermineroit à procurer une plus prompte
guérison au malade par une opération qu'il démontreroit nécessaire.
un fait ne suffit pas seul pour décider; mais il est vraisemblable que par
le Taxis l'intestin jouera toujours sous l'anneau, quand l'étranglement ne
sera formé que par le sac herniaire à quelque distance de l'anneau du
côté du scrotum, & quand ce sac en même temps aura contracté des
adhérences avec les parties qui l'entourent.

(2) Sur de hern. T. 2. p. 47.
(b) ibid. p. 27.
Il est à souhaiter que d'autres observations confirment la vérité de cette
remarque, d'autant plus que M. Arnaud fonde de la difficulté de
reconnoître l'étranglement de péritoine (a); & qu'il dit qu'on doit se
déterminer à faire l'opération le plutôt qu'il est possible, quand on
soupçonne que le sac herniaire forme l'étranglement (b). En effet il est
impossible de réduire une pareille hernie; Et ne vaut-il pas mieux se
hâter de faire une opération inévitable que de s'exposer par un retard
dangereux à voir le malade hors d'état de la supporter. Voitures, jeune &
d'un bon tempérament, péritoine pour avoir été laissé sans opération du
6 janvier au 2. au signe caractéristique de l'étranglement formé par le
péritoine me l'aurois fait opérer & quand j'eus vu pour la première fois
le sixième signe présenté par M. Arnaud (c) beaucoup de rapport avec celui
que j'ai observé dans Voitures, cependant il n'en parle même; il en aise
d'en fournir la différence.

(c) ibid. p. 80.
(d) ibid. p. 82.
Avant que d'opérer Voitures j'en remarquai trois l'Espece de filons ou de
cercles qui selon M. Arnaud se manifeste quelquefois par dessus la peau du
sac herniaire étranglé par le péritoine (d). C'est tout ce que ce signe me
caractérise par toujours un étranglement de cette Espece & qu'il fourme
aussi à celui qui se joint des bords & pourroit être continu d'un fascia lata.
j'ai rencontré depuis peu ce même filon, quoique l'intestin ne fût étranglé
que par l'anneau. Voici le fait.

(ça suit à la première occasion.)

Observation III. Sur un Entérocele, où l'intestin adhérent
au sac & étranglé par l'anneau, paroissant l'être par le
sac herniaire avec une portion de l'Epiploon.

Le soir du 27 juillet dernier (1756), on conduisit à l'hôpital de Dijon,
Mlle Didier, âgée d'environ 55 ans, domestique. Elle m'apprend qu'elle avoit
depuis six ans une hernie inguinale du côté gauche; que quoiqu'elle portât
depuis longtemps un bandage, sa hernie lui occasionnoit plusieurs fois par an
des folies considérables; qu'elle étoit tourmentée sans
relâche de semblable folie son ventre ne se pouvoit ouvrir, qu'elle rendoit
par la bouche tout ce qu'elle avaloit & qu'elle y avoit trois jours qu'elle n'avoit
des matières très fécales. Plusieurs autres accidens faisoient d'un intestin
étranglé & me déterminèrent à proposer l'opération qui fut renvoyée au
lendemain matin.

Le 28, les accidens étoient toujours les mêmes, je me disposai à faire l'opération
après que plusieurs de mes confrères en eurent aussi reconnu la nécessité. La
tumeur étoit plus grosse qu'un œuf de poule d'inde & s'étendoit plus en largeur
qu'en longueur. Je reconnus sous la peau une espèce de filon qui séparoit
la tumeur en deux parties inégales, dont la plus petite du volume d'un œuf
de pigeon étoit située obliquement du côté du Pubis.

En touchant la grosse portion de la tumeur on fello qu'on avoit sous les
doigts, on distinguoit plusieurs inégalités molles: sous la première pour une
portion de l'Epiploon engagée dans la hernie, & nous soupçonnâmes que le filon
étoit occasionné par un étranglement provenant du sac.

Après l'incision de la peau je vis à nu la petite tumeur séparée de l'autre
par une bride qui n'apparut pas après que le sac fut étranglé l'intestin qu'il
renfermoit; & cette tumeur n'étoit qu'un foie gras fort tendu; les
inégalités qui paroissent sur la tumeur principales étoient aussi formées par la
graisse. J'ouvris le sac, il sortoit beaucoup d'eau & l'intestin étoit fort éloigné de
l'étranglement; il n'y avoit point d'Epiploon. En cherchant l'obstacle qui empêchoit
la hernie de rentrer dans le ventre, je reconnus de nombreuses adhérences entre le sac
& l'intestin supérieur depuis l'anneau jusqu'à un demi-pouce en dehors.
Je distinguai ses parties avec le bistouri & je fus obligé de dilater l'anneau, pour faire
rentrer l'intestin que j'avois bien détaché du sac. Les accidens cessèrent après l'opération
& la malade a été promptement guérie.



Il en a remarqué ici que la bride fournie par les fibres transversales du fascia lata n'étranglait pas l'intestin, puisqu'elle étoit située beaucoup plus bas que je ne trouvois le boyau quand le sac fut ouvert. L'opée de fellow quel on distingue par de petits grains dans les hernies ne caractérise donc pas toujours le siège de l'étranglement de l'intestin, soit qu'il dépende du prolongement d'une veine ou que du fascia lata, soit qu'elle résulte d'une desac herniaire le prodisse. Cette remarque nous paroit utile pour prévenir l'erreur où l'on seroit si après avoir coupé cette bride on croiroit toujours avoir levé l'obstacle à la rentrée de l'intestin, & les mauvais effets qui pourroient résulter de la fatigue du boyau, si l'on s'opiniâtroit à vouloir le remplacer dans le ventre sans soupçonner qu'il fût étranglé dans un autre endroit. On ne peut trop s'attacher à distinguer parmi les signes ceux qui sont caractéristiques d'une maladie, de ceux qui sont souvent équivoques. Il en a quel que fois trop tard de se reconnoître fautive que dans le même de l'opération.

La petite tumeur ovoïde formée par le corps gras se trouvoit en elle n'entra pas beaucoup en opération sur la hernie de Louise Didot. Quoiqu'elle n'eût pas la couleur du sac herniaire ni celle de l'intestin, je sentois en la maniant que c'étoit une espèce d'enveloppe qui paroisoit embrasser un autre corps de la consistance d'un intestin aride: je me l'indiquai avec beaucoup de circonspection, & je reconnus alors que c'étoit une poche purement graisseuse qui en renfermoit une autre de même nature, après laquelle & dans laquelle il y avoit un aride. Cette tumeur qui étoit à peu près de la grosseur d'un œuf de Pigeon, comme j'en ai déjà fait observer, étoit bridée par les fibres transversales du fascia lata.

Comme je n'ai vu la maladie sous la première fois que la veille de l'opération & même fort tard, j'ignore si cette tumeur paroisoit depuis les huit jours que l'intestin étoit étranglé: mais ce que je puis assurer c'est que, quoique la maladie eût le corps assez gros, on ne pouvoit distinguer à l'aîne gauche où il y avoit point de hernie, aucune partie du corps adipeux après saillante pour former une tumeur semblable à celle que je viens de décrire, mais encore la inégalité située à la partie latérale externe de la hernie qui nous avoit fait soupçonner qu'une portion de l'Épiploon étoit contenue dans le sac herniaire.

Qu'il me soit permis de hasarder une conjecture qui, quand même elle ne toucheroit pas au vrai, ne pourroit au moins porter aucun préjudice à la pratique chirurgicale. Je présume que la petite tumeur graisseuse & les autres inégalités de même espèce ne se sont distendues que depuis

l'engorgement de l'intestin, & quelcun distendu considérablement à l'air intérieur. Voici surquis je me fonde. une suppuration moins abondante à la vérité qu'il ne falloit pour former une collection de pus ou un abcès, mais suffisante pour pénétrer le tissu graisseux sans désunir ses cellules & être le premier produit de l'inflammation, survenue à la hernie depuis huit jours & communiquée à toutes les parties voisines. Suivant cette opinion qui appartient à M. Meunier (2), je pense que pas l'extravasation quoiqu'insensible de suc puruleux dans le tissu graisseux, & les particules de l'air (dépouillées de leur élasticité lorsqu'elles sont disséminées dans nos ligaments qui forment naturellement) se sont séparées de ces sucs purulents, se sont rassemblées dans les cellules graisseuses, pour recouvrer leur ressort, & les ont dilatées au point d'être saillantes qu'on les sentoit à travers la peau & qu'on voyoit même avant l'incision une partie de la plus grosse cellule s'échapper du côté du pube. j'ai ajouté que l'inflammation longtem continuée favorisoit encore l'extension des cellules par la chaleur qu'elle communiquoit aux parties voisines d'un air enfermé.

Suivant cette première idée que je conçus le lendemain de l'opération de Loure Didier, je me proposai d'examiner attentivement ce qui deviendroient les cellules graisseuses incisées & si quelque dilatée que j'avois prise avant l'incision pour une partie de l'épiphore & que j'avois laissée sans les ouvrir. j'ai remarqué qu'elles pendant quatre ou cinq jours elles se sont distendues davantage, elles ont été plus solides & plus fermes au touché: j'y ai distingué beaucoup moins d'inégalité qu'au paravant; Elles formoient au contraire une tumeur plus arrondie, après saillante pour faire soupçonner que l'intestin s'étoit échappé de nouveau, si l'on n'y eût jeté qu'un coup d'œil. Quoique les bords de l'incision fussent élevés, ils l'étoient beaucoup moins que cette masse graisseuse ouverte & de bords rouges & qui s'empêchoient les bords de s'approcher pour faciliter leur réunion. Quand la suppuration a été bien établie, l'inflammation s'est affaiblie peu à peu, se duvet a diminué, elle a disparu dans la suite & les bords de la plaie se sont rapprochés pour former une bonne cicatrice.

Ces observations confirment mon opinion sur l'élasticité de l'air réintégré dans les cellules. Avant l'écoulement du pus, qu'on appelle improprement l'établissement de la suppuration dans les plaies, puisque le pus est formé quelque temps avant que de couler, l'air se rassemble en plus grande quantité dans les cellules graisseuses, & ainsi la distension plus grande



nombre & il a formé une tumeur plus arrondie : Quand le pus a coulé d'une manière sensible. C'est à dire, par des voies bien ouvertes en conséquence de la rupture des cellules, l'air a trouvé une issue pour se échapper & par conséquent se estaturent a diminuer par degrés jusqu'à une entière guérison.

Je n'admets pas une aussi grande quantité d'air raréfié dans les cellules que si il y avoit emphysème ; la source qu'il fournit n'est pas aussi féconde que celle qui produit la tumeur emphyseuse : il y a trop peu de fucs purulents, ou ceux qui restent au même, n'ont pas été entre-
decomposés pour que les particules d'air raréfié n'aient pas été entre-
petites nombre lorsqu'elles se sont séparées. Aussi les cellules grasses ne
plus saillantes que dans l'état naturel conservoient celles, surtout le jour de
l'opération une certaine source qu'on n'auroit pas rencontrée si l'air enfermé
en étoit plus abondant. La tumeur ovale située du côté du pubis étoit dans
ce dernier cas : C'étoit un sac gras plus distendu que les autres, parce que
la bride épigastrique du fascia lata s'opposoit à ce que l'air raréfié dans cette
cellule se communiquât aux voisines ; tandis que cette communication
n'étoit point interrompue entre les cellules placées du côté des côtes des isles,
elles étoient & moins dilatées & plus molles que l'autre.

Je ne pouvois pas attribuer cette dilatation des cellules grasses à la
seule présence d'un liquide ou d'un gaz dans leur centre ou enbarassé dans
leurs parois ; puisque l'espace vuide que je trouvois dans la plus grosse d'entre
elles étoit trop grand pour que rien en sorte par le vuide, si l'on
en est. Sans doute que les fucs purulents avoient été repoussés par les
vaisseaux absorbans des parois de cette cellule ; il est aussi naturel que
ces mêmes vaisseaux aient refusé le passage à l'air raréfié ; Et si je ne
distinguai pas un sifflement lorsqu'il se échappa de la cellule, C'est que ses
parois quoique plus épaisses que dans l'état sain n'avoient pas assez de
fermeté pour l'occasionner, surtout vu la petite quantité de l'air enfermé
& la grande ouverture que j'eus à l'autre.

Si ces remarques ne suffisent pas pour rendre mon opinion
vraisemblable, arrêtons-nous un moment à des faits si communément
observés qu'on ne peut les révoquer en doute : ils contribueront à prouver

que le reflux de l'air rassemble dans la tumeur par la décomposition de nos
 Sucs, en augmente le volume. Dans la gangrene humide lorsque l'on fait de
 taillades sur les parties sphacelées, on s'appercoit distinctement qu'il en sort
 des bulles d'air; l'effluve qui accompagne cette mortification des parties
 dépend autant d'une espèce d'empyème que de la stagnation des humeurs:
 En portant le doigt dans les taillades on sent par une légère compression le
 frémissement de l'air qui s'échappe. La présence de l'air ne se manifeste
 ici que parce que les humeurs etant encore plus décomposées dans le sphacèle
 que dans la suppuration, il y a un plus grand nombre de particules aériennes
 rassemblées: Elle se trouve même dans les collections de pus, dans les grands
 abcès. j'ai remarqué il y a long tems qu'une bulle d'air assez considérable
 sortoit avec le pus à l'ouverture de ces sortes de tumeurs; j'en ai guéri
 au vu en si grand nombre, qu'en buvant il y a quelques années une tumeur
 prodigieuse prête à s'avoir d'elle-même, occasionnée par le spina Ventosa de
 l'extrémité inférieure d'un fémur. Si l'on fait même bien attention à
 l'écartement considérable des lames osseuses dans cette maladie, on se
 trouvera peut être forcé d'avoir recours à l'air rassemble après la désunion des
 Sucs pour expliquer le gonflement extraordinaire de l'os, puis qu'il n'y a
 alors de la substance solide en proportion de son volume &c. C'est ici l'expérience
 si connue en Physique de la force de l'air dans la multiplicité de l'espace qu'il
 trouve entre les mains de la Nature.

Je ne doute pas qu'une attention bien marquée sur les phénomènes de
 gonflement qui arrivent, soit l'altération de sang à la suite de l'inflammation,
 de la suppuration, de la dissolution, de l'émulsiement &c. ne fasse bientôt
 reconnoître quel l'air rétrovisé, pour ainsi dire, dans les parties foibles
 beaucoup à l'élévation de ces tumeurs. j'en ai rencontré dernièrement un nouvel
 exemple dans la hémie d'une jeune fille rapportée l'histoire.

Observation IV. sur une hernie fœtale dans le sac avois
 un gonflement emphysemateux (ou emphysemateux.)

une femme étrangère, âgée d'environ 40. ans, fut transportée à l'hôpital
 de Dijon le 27. du mois d'Août dernier (1756). j'est vis dans la matrice.
 Elle me dit qu'il y avoit près de deux ans qu'à la suite d'un effort considérable
 il lui étoit survenu pour la première fois une hernie du côté droit qu'elle avoit



portée pendant plus de trois mois sans une grande incommode; & après
ce temps elle a été tourmentée de folles trévisions occasionnées par
l'émigration de cette dernière qu'on étoit parvenu à faire rentrer &
qui avoit disparu totalement jusqu'en 7 de ces mois, qu'en chargeant un
fardeau elle avoit d'opressé une douleur vive au même endroit & chassé
l'ancienne hernie; Que les saignées, les évacuons & le sautier remède
qu'on avoit mis en usage depuis quatre jours pour faire passer l'accident
ne l'ont point empêché d'avoir un vomissement fréquent, des douleurs
continuelles dans le ventre & une constipation opiniâtre.

J'examinai la tumeur: C'étoit une hernie fémorale du Volume d'une
grosse noix; fort tendue & peu douloureuse; Le ventre étoit beaucoup plus
les intestins étoient si gonflés qu'on en distinguoit à l'œil quelques flexions
surtout à la partie inférieure de l'abdomen considérablement tendu: Le malade
étoit faible & le malade dans un grand abattement. J'essayai de faire rentrer
l'intestin: D'abord la tumeur diminua un peu de volume sous une digite;
ensuite elle se fit de fibres à mes tentatives continuées avec précaution;
cependant elle ne revint pas à sa première grosseur quand j'eul touché plus.

L'impossibilité de la réduction par les taxis & les frictions étoit de la malade une
détermination à puis plusieurs de mes confrères & de nos aides de leurs conseils dans
un cas où l'opération me paroît absolument nécessaire & son succès très
equivocal: M. Duvet qui étoit alors à Dijon voulut bien se rendre à
l'hôpital avec ce malade dans l'après-midi. Il y fut délibéré qu'en présence
de mauvais pronostic tiré de l'accident actuel (le poulx étoit encore plus petit
que le matin, & le ventre affaissé) l'opération seule pouvoit donner une lueur
d'espérance. Je la fis sur le champ.

J'eus beaucoup de peine à trouver le sac herniaire: Je le vis enfin & à son
ouverture il en sortit un peu de sérosité. Quand il fut entièrement ouvert, je
fus fort étourdi de rencontrer un corps qui me ressembloit à rien d'autre que d'un
intestin: C'étoit un petit corps ovalaire un peu applati dans sa face supérieure &
inférieure (la malade considérée dans la situation couchée) & se trouvant dans son bord:
Au premier coup d'œil il me parut pour un ovaire entouré d'hydaires: Je
n'adoptai pas cette idée, parce qu'en maniant ce petit corps qui étoit mou et
entre mes doigts je sentis à travers son épaisseur qu'il renfermoit dans sa
portion du côté de l'arcade un autre corps moins saillant, je me déterminai

à l'ouverture: C'étoit un second sac, dont il sortoit un peu de matière purulente formée & dans lequel j'allois une portion d'intestin redoublée simplement pincée sous l'arcade. D'où je la dégageai bientôt. Le malade n'a souffert que quelques heures à une opération faite trop tard. L'ouverture de son fadaire nous fit voir le lendemain que quoique le pincement de l'intestin n'eût été qu'à une portion pas plus large que l'ongle du pouce, il y avoit une très grande partie de l'ileum gangrenée.

J'ai fait que quelques observations sur ce qu'on a vu, & que quelques fois on rencontre deux sacs: je n'ignore pas que des auteurs célèbres ont enseigné qu'on n'en pouvoit trouver qu'un seul, & que les raisonnements viennent à l'appui de leur propre expérience pour établir cette dernière opinion. J'en serois encore partisan, si la hernie de l'Inguine ne m'eût pas prouvé que deux sacs pour le même intestin ne sont pas incompatibles. La sérosité intermédiaire de deux sacs qui sortent à l'ouverture du premier siffroie pour fonder de leur existence réelle, quand bien même je n'aurois pas distingué à l'œil & au bistouri la substance du premier sac bien différente de la seconde cellule formée par les téguments qui le recouvrent & auxquels il étoit fort adhérent. Il ne me reste donc aucun doute sur leur réalité: pourrai-je me flatter de leur laisser aucun subsistement. Voici comment je la ferois.

Lorsque la hernie parut pour la première fois il y a environ deux ans, le péritoine fournit une enveloppe à l'intestin: ce fut le premier sac; qui trois mois après contracta des adhérences avec le tissu graisseux dans le tégument que la hernie fut étranglée. On réussit alors à réduire le tégument; mais le sac adhérent ne put pas changer de situation. Rappelons-nous qu'après la réduction de la hernie, elle ne se plus montrée quoique le malade ne portât point de danger: le tissu cellulaire qui accompagne les vaisseaux furaux gonflé par les inflammatoires des parties avoisinantes ne réduisit l'intestin, & sans doute un peu des uns dans la texture par la suppuration insensible, devint adhérent à l'arcade lorsque le tégument fut rentré, ferma la route qu'il s'étoit ouverte & fit l'office d'une pelotte mollette qui se fut opposée à la sortie de l'intestin, sans que le mouvement de l'étrangère n'eût pas été forcé. Le sac herniaire qu'on se voit affaissé sur lui-même sans s'oblitérer & cette femme a bien été radicalement guérie de sa descente, par laquelle a passé plus de dix-huit mois sans qu'elle reparût. Elle étoit dans l'effort violent qu'elle fit de du mois de Juin, l'intestin chassa devant lui le tissu cellulaire graisseux qui occupoit l'ancien vuide.



20.
sous l'arcade: (ce tissu se détache facilement), se gonfla par l'inflammation, forma
ce second sac de la figure d'un ovaire qui se fit voir quand l'incision fut faite
au premier. Ses parois n'étoient pas cette fermeté que l'on reconnoît
ordinairement au sac herniaire; mais il étoit comme une membrane d'une
texture serrée qu'il se formoit, mais un tissu naturellement lâche & qui ne
devoit son espèce de consistance qu'à l'épaisseur produite par la maladie. Ainsi
dans l'idée que j'ai formée de ces deux sacs, je ne les regarde pas tous deux
également comme une production du péritoine; mais je pense que cette
membrane ne formoit que le premier, & que l'autre étoit formé par le
tissu graisseux qui entoure les vaisseaux furaux. C'est peut-être la seule
explication propre au cas dont il s'agit: En effet il seroit difficile de s'expliquer
comment le péritoine pourroit former deux sacs; & je ne suis pas encore qu'on
en ait vu l'existence par la seule difficulté d'expliquer le phénomène.

Celui de la texture de ce second sac que dépendoit le fester que j'observai
dans son bord & qui se représentoit un fendoir d'hydatide. Il étoit occasionné
principalement par la dilatation de l'air dans des cellules séparées de sa surface
& bûchées par des fibres transversales qui ne s'étoient point prêtées à l'extension
très remarquable des parois de ces cellules: C'étoit un produit de la dépravation
des fibres dans les membranes même de ce sac. L'examen scrupuleux que
j'en fis le lendemain ne trouva que quelques parties tendues et enroulées
emphysemateuses qu'il honora.

Encore une réflexion sur cette hernie: Elle m'est présentée par la diminution
qui survint au ~~1er~~ Volume de la tumeur lorsque j'e tenté de la faire rentrer à
ma première Visite, & qui resta constamment la même jusqu'au moment
de l'opération quelques heures après. On voudroit à l'appui du cadavre
attribuer cette diminution de Volume à l'ouverture du boïau, sur ce que j'y
trouvai un petit trou déchiré le lendemain de l'opération: Ce n'étoit pas une
matière purulente, disoit-on, que le sac renfermoit; C'étoit une matière
chylacée, & j'en avois chassé une partie dans le tuium intestinal en voulant
réduire la hernie: Cette opinion ne pouvoit pas se soutenir, puisqu'en se parant
de manière la tumeur, elle auroit repris au moins son premier Volume;
Aucune cause n'auroit empêché la matière chylacée de rentrer dans le sac d'où
je l'aurois fait sortir le matin: D'ailleurs je suis assuré que le trou déchiré du
boïau vu sur le cadavre n'étoit pas dans le sujet vivant; ma première opinion décisive.
La Malade a survécu huit heures à l'opération, pendant lequel temps elle a

pris plusieurs bouillons, beaucoup de tisane & de la potion cordiale: & toutes ces
matières ne se trouva épanchées dans le bas-ventre, où on en auroit
certainement rencontré quelque portion, si le petit déchirement que
imperceptible ne se fût pas fait en maniant, sur le cadavre l'intestin ~~apparaissant~~
absolument gangrené.

Cette diminution ne dépendoit pas non plus d'une partie de l'intestin qui
fut rentrée, puisqu'il n'étoit que pincé; D'ailleurs la description du
pincement que j'appercus dans un seul endroit du boia à l'ouverture du cadavre;
me prouva que j'aurois trouvé dans le sac en opérant tout ce qui en étoit passé
sous l'arcade depuis le renouvellement de cette hernie. Je vis en même temps sur
la surface de quelque circonstance de l'ileum voisine de l'endroit pincé
une grande matière jaunâtre plus épaisse que celle que j'aurois trouvée dans le second
sac à l'instar de l'opération, mais de la même nature. Je ne doute pas que
la tumeur herniaire n'ait diminué de volume lorsque j'épiais de la réduire,
parceque en la maniant j'ai fait rentrer dans la capacité du bas-ventre une
partie de la matière jaunâtre renfermée dans le sac. Il lui falloit peu d'espace
pour y pénétrer malgré le pincement; une légère force suffisoit pour faciliter
son introduction; une grande en étoit nécessaire pour occasionner son retour.
Aussi ne venoit-elle point sur se pas. L'observation suivante démontre
complètement que mon opinion sur le passage de la matière du sac n'est
point une idée vague.

Observation V. Sur une hernie qui diminue de volume
par l'épanchement dans le bas-ventre du liquide
contenu dans le sac.

Un chirurgien qui étoit présent à l'opération que je fis à la hernie de
l'Enfance & à qui j'exposai mon sentiment sur la cause de la diminution
permanente de la tumeur, me dit qu'il avoit été appelé il y a quelque
année pour secourir une femme dans les accidents d'un intestin étranglé;
qu'en épiais de réduire la hernie son volume avoit diminué considérablement
sans disparaître tout à fait; que fondé sur ce demi-succès il avoit différé
l'opération dans l'espérance de faire rentrer entièrement la tumeur; mais que
s'étant appercu les mêmes jours par la violence des accidents qu'il y auroit eu trop
de danger de remettre au lendemain une opération nécessaire alors, il l'avoit
entreprise; qu'il avoit trouvé beaucoup de difficulté à la faire parceque le sac étoit
immédiatement appliqué sur l'intestin sans y être adhérent, mais aussi sans

22.
qu'il y eut aucun liquide qui le séparât; que cependant il étoit
parvenu à les distinguer & à faire rentrer l'intestin. Voici ce qu'il y a de
plus remarquable dans cette opération: L'écoulement de la sérosité fut
replacé dans la cavité du bas ventre; il en sortit avec vitesse plusieurs
cuillerées de sérosité, que le chirurgien regarda avec raison comme celle
du sac qu'il avoit chassée dans le bas ventre en tentant la réduction de la
hernie, & dont la sortie du sac avoit occasionné la grande diminution de
la tumeur. Le chirurgien m'ajouta que l'écoulement de la sérosité étoit
sans à peu près de la même manière que celui des laines peu abondantes du
fœtus à l'expulsion des membranes lorsque l'accouchement est prochain:
il m'assura aussi que son opération avoit été suivie du plus heureux
succès.

Ce n'est partant qu'à la même cause qu'on doit attribuer la
diminution permanente du volume des hernies: mais ce n'est pas ici
le lieu de présenter toutes celles dont elle dépend. Plusieurs fois elle a
suivi la rentrée partielle de l'intestin; j'en ai vu au mois de juin dernier
(1756) un heureux exemple.

Observation VI. Sur une hernie fœtale; où
l'intestin rentre en deux lieux.

Il y avoit plus de trois jours qu'une femme, âgée d'environ 20. ans,
souffroit au quatrième mois de sa première grossesse les accidents ordinaires d'un
intestin étranglé dans une hernie fœtale qu'elle portoit depuis plusieurs années,
quand j'en fus appelé en consultation avec M. Eaux par M. Hare qui
traitoit la malade. Nos avis se réunirent sur la nécessité d'une prompte
opération. Tandis que M. Hare préparoit les choses nécessaires, j'e-
munais de nouveau la tumeur & jela sentis diminuer sous mes doigts du
tiers au moins de son volume; mais nous espérâmes inutilement tous trois
de faire rentrer les deux autres tiers: cependant nous espérons d'une
réduction complète & nous résolûmes de suspendre l'opération. Les
accidents persistèrent, le vomissement continua: la tumeur quoique plus
petite étoit aussi dangereuse qu'auparavant; nous renouvelâmes sans
succès les tentatives du taxis; il fallut revenir à notre premier avis.
M. Hare alloit faire l'incision des téguments, lorsque M. Eaux en

retrouvant la tumeur sentir l'intestin qui fuit & entend le gargouillement. Ainsi la malade fut heureusement préservée d'une opération qu'elle étoit prête à souffrir, dont elle peut encore se garantir dans la suite par de précautions convenables & éviter le malheur d'une fille que je vis opérée d'un bubonocèle par M. Nares il y a quelques années.

Observation VII. Sur une hernie inguinale rentrée
inopinément.

Dans le cours de l'année qui précéda celle où cette fille fut opérée avec succès, elle avoit eu par rapport à sa hernie des accidents si liés qu'elle menaçoit d'une mort prochaine. L'opération fut proposée comme le seul moyen de s'en préserver: M. Nares d'accord avec les consultants alloit l'entreprendre, quand il s'aperçut que la mauvaise situation du lieu de la malade le gêneroit dans ses mouvements; il fut placé la fanchette selon son intention sans que la malade fût du tout, & lorsqu'il voulut opérer il ne trouva plus de tumeur: le mouvement de la fanchette avoit facilité la rentrée de l'intestin.

Il faudroit un volume pour renfermer toutes les singularités que l'on rencontre dans la pratique des hernies. Malgré la longueur de ce mémoire, je m'arrêterai encore à deux observations qui feront voir combien les signes extérieurs sont faibles & d'en imposent au praticien le plus attentif.

La moleste d'une hernie, jointe à quelque irrégularité que l'on distingue au toucher en le signe le plus marqué de la présence de l'épiploon dans la tumeur herniaire: cependant j'y ai trouvé cette membrane qui se trouve dans une situation propre à l'y faire sentir, sans qu'il m'eût été possible de l'y soupçonner avant l'ouverture du sac.

Observation VIII. Sur une hernie crurale, où l'épiploon enveloppoit l'intestin.

Joseph & Nicolas, domestiques, âgé de 45. ans, affligé d'une hernie depuis six, fut transporté à l'hôpital de Dijon le matin du 16. tour dernier (1766), à l'occasion d'un intestin étranglé depuis trois jours: Avant que d'y faire faire aucun remède, on avoit employé sans succès le remède ordinaire. Les accidents étoient considérables & pressans: je consultai dans l'après midi M. Daxel & plusieurs de mes confrères qui voulurent bien se joindre à

L'hôpital reconnurent la nécessité de l'opération. je la fis en leur présence.

C'étoit une hernie finale située du côté droit, plus grosse qu'une œuf de poule, dont elle imitoit la figure, parfaitement lisse & égale dans sa superficie, recouverte, & qui antérieurement étoit à plusieurs d'entre nous qu'il y avoit beaucoup de sérosité dans le sac herniaire. Par l'incision j'y en trouvois très peu: je n'appercus pas l'intestin je ne vis qu'une masse grasseuse bien arrosée qui remplissoit presque tout le sac; en la touchant j'y reconnus du côté du Pubis une ligne de séparation & je développai avec le doigt sans rien déchirer une portion assez large d'Epiploon qui entourait exactement une partie de l'ileum en bon état; il n'y avoit aucune adhérence; je dilatai l'arcade; l'intestin fut bientôt repoussé dans le bas-ventre, & je fis la suture de n'y pas replacer l'Epiploon qui ne paroît pas altéré. Il me vint d'abord l'idée que de le couper; on vouloit que j'en fisse la suture; je n'y opposai. En fin il fut résolu que je le laisserois hors de la plaie pour y tomber en putrification. Je le développai sous le bord & je pansai la plaie. Dans la suite cet Epiploon se considérablement tuméfié; il s'en fit une suppuration: mais il ne presentoit pas même au bout de quinze jours l'apparence de la mortification la plus légère; quand je me fis déterminer à le couper sans le déter. Il formoit alors un champignon sous inégal qui pouvoit avoir environ deux pouces & demi de diamètre & plus d'un demi-pouce de hauteur. Il sembla inutile de faire remarquer que cette section n'a point été sensible au malade; il me suffit de dire qu'elle n'en fournit pas deux feuilles de sang. Je travaille à consumer le reste de cette masse grasseuse qui n'en la que pour retarder la parfaite guérison du malade, dont la plaie sera certainement cicatrisée si j'en fais rentrer l'Epiploon dans le ventre, comme je le desois. Cette faute pourra néanmoins être avantageuse au malade, en ce que la portion d'Epiploon qui restera dans la plaie depuis l'arcade jusqu'à la cicatrice extérieure servira dans la suite d'obstacle à une nouvelle sortie de l'intestin.

Après avoir coupé la masse Epiploïque je l'ai examinée même dans son ventre avec beaucoup d'attention. j'y ai vu des cellules dilatées & presque vuides: ce qui sert à confirmer mon opinion sur l'effet de la particule aérienne suspendue, dont j'ai parlé à l'occasion de mon 2^e Observation. Lorsque Nicolas fut pansé le jour que je fis rentrer la hernie, je priai mes confrères & de me donner leur avis sur un autre malade dont voici l'histoire.

Observation IX. Sur une fausse hernie qui Présentait
Plusieurs signes d'une Vraie.

Nicolas Bourgoin, âgé d'environ 26 ans, d'une bonne constitution, s'est fait fondre à l'hôpital depuis quelques jours. Il avait une tumeur qui s'étendait depuis l'anneau droit jusqu'à la partie inférieure du scrotum, plus grosse de côté que de l'autre : on y reconnaissait une fluctuation profonde qui n'était point apparente en l'air, quoiqu'elle tînt jusqu'à l'anneau ; ou plutôt ce prolongement paraissait être une tumeur distincte de l'autre par une ligne de séparation, un filon transversal, situé vis à vis le petit diamètre à peu près fœtal du trou ovalaire.

Le malade nous raconta qu'il y avait plus d'un an qu'il enflait et se surmenait au scrotum, sans qu'il lui fût possible d'en assigner la cause ; que jamais il n'avait eu aucune maladie vénérienne ; qu'on lui avait fait l'année dernière une incision à cette partie où l'on avait déjà su reconnaître le panchement d'un liquide & qu'il n'en était rien sorti ; qu'il n'avait que depuis dix jours la tumeur dans l'aine ; qu'elle était subitement survenue à la suite d'un effort ; qu'à son invasion elle avait été accompagnée d'un vomissement qui avait duré deux jours, pendant lequel temps le ventre n'était point ouvert ; qu'alors il avait été tourmenté encore par une colique & par la fièvre : mais que depuis huit jours tous ces accidents avaient disparu, & qu'il ne lui était resté qu'une nouvelle tumeur dont il désirait être guéri au plus tôt que de l'ancienne.

Ce rapport & l'examen de la partie me firent croire qu'un hydrocele formait la tumeur du scrotum & qu'un intestin cyderan se trouvant enroulé, mais actuellement libre, constituait la tumeur inguinale. L'effort dont ~~elle~~ ^{il} date, la fluctuation profonde de l'ancienne, l'absence de rénitence de la nouvelle, le filon transversal qui les séparait & les accidents mentionnés contribuèrent naturellement à établir mon opinion sur cette maladie : Elle paraît plausible : il faut s'occuper ensuite de moyen de guérison. Il me fut fortifié qu'un habile Chirurgien avait été trompé l'année dernière par la fluctuation apparente de cette tumeur du scrotum ; ce qui me fit refuser mon consentement à la ponction que l'on me proposait pour sonder le terrain. Je représentai qu'il s'ensuivrait des dangers & beaucoup plus utiles de faire d'abord avec beaucoup de



Circumsection d'une incision longitudinale, d'environ deux pouces dont le sillon transversal seroit le milieu; quelle seroit un moyen infallible pour nous éclairer sur la nature de ces deux tumeurs, & que je pourrais la prolonger en haut & en bas, sel' bas des fesses l'exigeoit d'après un éclaircissement nécessaires. mon avis fut approuvé; je fis l'incision proposée.

q'avois déjà ouvert les tégumens de l'épaisseur de plus de deux gros écus sans rencontrer autre chose que des feuillettes membraneuses fort épaisses & fort dures, quand je parvins à percer un sac d'où nous vîmes sortir environ deux cuillerées de sérosité: q'ien prolongeai l'ouverture au moyen de ma sonde cannelée selon toute la trajectoire de l'incision des tégumens. J'avis reconnu alors qu'il n'y avoit qu'un seul sac plein d'une gelée transparente, aussi ferme que de la gelée de forme de ferf, dont je ramenois plusieurs morceaux avec le doigt. Je touchai l'anneau qui étoit en bon état & qui n'avoit laissé échapper aucune portion d'épiploon ou d'intestin. Alors ne craignant plus de blesser aucune partie intéressante, q'ouvris le sac dans toute sa longueur jusqu'au bas du scrotum qui avoit un bon travers de doigt d'épaisseur en cet endroit: j'en retirai une quantité considérable de matière gélatineuse; & après l'avoir vuide entièrement, je trouvais le testicule droit bien sain & de grosseur ordinaire appliqué sur la partie postérieure du sac: cette plaie donna très peu de sang. M. David nous dit qu'il avoit rencontré autrefois un hydrocele de cette espèce. Quatre jours après l'opération le scrotum étoit presque réduit à son volume naturel: la suppuration a été peu abondante; il n'est pas fait aucun autre écoulement de sérosité que le suintement qui accompagne d'ordinaire toutes les plaies dans leur suppuration. La cicatrice est presque formée & n'a pas aujourd'hui plus de deux pouces de longueur quoique l'incision en eût plus de sept.

La matière de cette espèce d'hydrocele étoit vraisemblablement une lymphe naturelle épanchée dans une des poches du scrotum par la rupture de quelques uns des vaisseaux propres & dont la partie la plus liquide en rentre par l'absorption dans la masse générale de l'humeur. Des fibres disposées en ligues du fascia lata forment sans doute le sillon transversal qui se paroit d'autant en deux portions, dont la supérieure ne s'étoit développée que depuis dix jours par le déchirement de quelques brides membraneuses dans le testicule malade, & par un effort; une partie de la matière lymphatique renfermée depuis longtemps dans le scrotum

fur poissés alors jusqu'à l'anneau sous lequel j'en trouvais quand le sac fut
ouvert: mais il est bien singulier que le vomissement & le d'autre
symptôme d'une hernie étranglée, que j'ai rapporté soient survenus le même
jour. S'échappa-t-il une portion de l'intestin qui auroit repris de
lui-même la place qu'il avoit quittée deux jours auparavant? L'étais-je
trouvai l'anneau empêché de le faire. Quelquefois la cause de cet accident
est indubitable que l'hydrocèle lymphatique n'y avoit aucune part. C'est
à la grande épaisseur du scrotum dans la partie inférieure qu'on doit attribuer
le succès de l'incision qui fut faite en cet endroit l'année précédente:
l'instrument ne pénétra pas jusqu'à la matière répandue: le scrotum que j'ai
appris qu'on y avoit passé dans la suite fut inutile parce qu'il ne traversoit
qu'une paroi épaisse du sac sans s'être ouvert une route dans la cavité même.

J'ai plus étendu mes observations sur la hernie que je me suis étendu
proposé: cela m'empêche de venir me dans la mémoire celle que le titre
annonce sur la pierre de la vessie & de l'urètre. Cerois-je contracté avec
l'Académie l'engagement d'en former un autre mémoire? C'est au succès de
celui-ci à m'apprendre si j'en dois le remplir. C'en seroit pas me fourvoyer à ses
intentions que de lui présenter des ouvrages qu'il lui seroit impossible
d'approuver. A Dijon ce 18. Septembre 1756. Boir



